

## Note sur les Proctotrypides [HYM.]

par Jean L. LICHTENSTEIN et François PICARD.

1. *Gonatopus Marshalli* Kieff. — Ce Dryinide que KIEFFER (1) a séparé du *lunatus* Kl. a été signalé en Angleterre et en Corse. Nous l'avons pris en fauchant sous les bois de pins de Bolquère (Pyrénées-Or<sup>les</sup>) à 1.800 m., au mois d'août. Il est intéressant de noter que les adultes étaient fort rares, et que cependant la plupart des Homoptères que nous avons vus dans cette région, étaient porteurs de larves de *Gonatopus*. Nous avons obtenu d'élevage une autre espèce non encore déterminée.

2. *Gonatopus formicarius* Ljungh. — Nous possédons de Lattes (Hérault) cet insecte connu seulement jusqu'ici d'Europe boréale et centrale.

3. *Parasieroia gallicola* Kieff. — On admet que ce Proctotrypide est gallicole; cependant il est sorti en janvier d'une branche d'orme sèche, à Montpellier; peut-être n'était-ce qu'un simple hivernage. C'est un Bethylide nouveau pour la faune de France.

4. *Bethylus fuscicornis* Jur. — Prédateur de chenilles d'après HALIDAY (2), gallicole selon d'autres auteurs, nous l'avons vu éclore de branches d'ormes, mais en juin, ce qui se concilie mal avec un simple hivernage.

5. *Pseudisobrachium pubescens* Kieff. — Une ♀ de cette espèce, décrite de Grèce, a été capturée dans l'Hérault.

6. *Cephalonomia rufa* Kieff. — On ne connaissait pas les mœurs de ce Béthylide. Il nous a été communiqué par M. PUEL qui l'a obtenu de tiges de *Salicornia fruticosa* L. où il est parasite du *Gastrallus immarginatus* Müll., en Camargue.

7. *Cephalonomia hypobori* Kieff. — Cet insecte, dont la description a paru dans PICARD (3), a été cité comme un parasite de l'*Hypoborus ficus* Er. C'est un hôte commun, à Montpellier, de plusieurs Scolytides, notamment de *Eccoptogaster (Scolytus) rugulosus* Ratz., dans le Prunier, de *Eccoptogaster amygdali* Guér., dans le Laurier-cerise, et de *Phloeosinus thuyae* Perris, dans le Cyprés.

(1) KIEFFER, 1904. *Proctotrypidæ*, in ANDRÉ, *Species des Hyménoptères*, t. IX.

(2) HALIDAY, 1834. Notes on the Bethyli and on *Orginus pedestris*. *Ent. Mag. London*, vol. 2.

(3) PICARD, 1920. Les Insectes du Figuier (*Ann. des Epiphyties* 1919).

8. *Pedinomma rufescens* Wetsw. var. *antennalis* Kieff. — Cette variété, nouvelle pour la France, a été trouvée sous une pierre basaltique enfoncée, et qu'on a été obligé de soulever au levier, à Agde (Hérault). C'est la localité habituelle d'un Coléoptère, l'*Anillus Mayeti* Ch.Bris.

9. *Lagynodes crassicornis* Kieff. — Nouveau pour notre pays, où l'on n'avait récolté jusqu'ici que le *L. pallidus* Boh.; trouvé en tamisant des feuilles mortes à St-Guilhem le Désert et à Castelnaud-le-Lez (Hérault).

10. *Plastomicrops acuticornis* Kieff. — Ce genre, qui n'a qu'une espèce européenne, était connu d'Italie. Nous l'avons également de St-Guilhem-le-Désert (Hérault).

11. *Rielia manticida* Kieff. — Les notes récentes de l'abbé KIEFFER<sup>(1)</sup> et de L. CHOPARD<sup>(2)</sup> nous engagent à parler de cet insecte que nous avons eu souvent l'occasion d'observer à Montpellier. Il est très commun dans l'Hérault, fixé sous les ailes de *Mantis religiosa* L.; nous l'avons cherché vainement sur *Iris oratoria* L. Il ne nous est pas éclos des oothèques récoltées, mais nous avons observé que ceux portés par les Mantes adultes se comportent comme le décrit L. CHOPARD.

12. *Galesus numidianus* Kieff. var. *obscuripennis*, n. var. — Nous avons trouvé à Montpellier, en octobre, cette nouvelle variété, différant du type nord-africain par les ailes rembrunies et par le sillon dorsal qui atteint la moitié de la longueur de l'abdomen, tandis qu'il dépasse à peine le tiers de celui-ci chez le type.

13. *Lepidopria pedestris* Kieff. — Trouvé à Agde (Hérault), en décembre, est nouveau pour la France; signalé jusqu'ici d'Italie.

#### Description d'un *Haania* Sauss. [ORTH. MANTIDAE] du Laos

par L. CHOPARD.

**Haania Vitalisi**, n. sp. — *Type* : Un mâle provenant de Xieng-Khouang, province du Tranninh (R. VITALIS DE SALVAZA, 14-I-19).

♂. Tête assez petite, le front excavé, présentant de chaque côté, en avant des yeux, un grand lobe foliacé, à bords un peu dentelés. Occiput assez court, faiblement bombé, noirâtre, portant un assez gros

(1) KIEFFER, *Bull. Soc. ent. France*, [1919], p. 357.

(2) CHOPARD, 1920, *C. R. Ac. Sciences*, Paris, t. 170, p. 140.